

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

28 MAI 1982

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION PROVENCE - ALPES - COTE D'AZUR et CORSE

(ALPES de HAUTE PROVENCE, HAUTES-ALPES, ALPES MARITIMES, BOUCHES-DU RHONE, HAUTE-CORSE, CORSE SUD, VAR, VAUCLUSE, SUD de la FRANCE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Siège de la circonscription : 24, Rue Edouard Delanglade - 13006 MARSEILLE

Station d'Alertissements : Quartier Cantarel - MONTFAVET Adresse Postale : B.P. 95 84140 MONTFAVET - TELEPHONE : (90) 88.21.83
ABONNEMENT ANNUEL : 85 F REGISSEUR DE RECETTES DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE AVIGNON CCP MARSEILLE 9660 74 V

SPECIAL CORSE N° 6

VIGNE

MILDIOU -

Deux foyers primaires viennent d'être découverts à Aléria et Casatorra. Il est rappelé qu'un traitement a été préconisé avant le début de la floraison afin d'assurer une protection préventive des grappes. La floraison a dès à présent débuté dans les situations et sur les cépages les plus précoces.

OIDIUM -

Cette maladie demeure virulente et les premières attaques sur grappes sont constatées. Effectuer un poudrage pendant la pleine floraison.

TORDEUSES DE LA GRAPPE -

Les éclosions sont constatées depuis une dizaine de jours et les premiers glomérules sont dès à présent visibles. Dans l'ensemble les taux d'attaque relevés jusqu'à présent sont faibles et ne nécessitent pas une intervention.

A signaler, cependant, dans la région d'Aléria et de Ghisonaccia quelques attaques ponctuelles d'Eudémis relativement importantes dépassant localement 100 glomérules sur 100 grappes.

N'intervenir avec un insecticide curatif que dans ce type de situation.

CICADELLE DE LA FLAVESCENCE DOREE -

Les premières sorties de larves sont constatées dans les foyers de Flavescence dorée connus (Patrimonio, Marana et Casinca). Le premier traitement à la charge des viticulteurs devra se situer aux environs des 15-20 Juin.

CICADELLE VERTE -

Les larves sont dès à présent nombreuses dans les secteurs infestés habituellement. Intervenir sans tarder si le seuil de 100 larves sur 100 feuilles observées est dépassé.

BACTERIOSE DES AGRUMES -

ARBRES FRUITIERS

De très fortes attaques sur feuilles et jeunes rameaux sont fréquemment constatées en Haute-Corse dans les situations fortement atteintes. De manière à éviter le repiquage de la maladie, effectuer sans tarder une pulvérisation de cuivre sous forme de sulfate de cuivre à raison de 400 g de cuivre métal/hl. Ne pas dépasser cette dose compte tenu de la floraison.

CARPOCAPSE DES POMMES -

Les captures en pièges sexuels demeurent très faibles à nulles. Ne pas intervenir pour le moment.

P 10

